


10.Veröffentlichung zur Datenerhebung

Das ist die 10.Veröffentlichung zur Datenerhebung des Internetportals www.borreliose-nachrichten.de.


Stand 10.03.2015

Wir werden an dieser Stelle regelmäßig zusätzlich eingegangene Daten publizieren.

837 befragte Personen




Ist ein Zeckenstich rememberlich?




526 (62,84%) der 837 befragten Personen erinnern sich an einen Zeckenstich.

Hatten Sie ein Erythema migrans (Wanderröte)?




340 (40,62%) der 837 Befragten hatten einen Erythema migrans, 497 nicht.

Wurde die Diagnose Borreliose im 1. Arztkontakt nach Beschwerdebeginn gestellt?




Bei 158 (**18,88%**) der 837 befragten Erkrankten wurde die Diagnose Borreliose im 1.Arztkontakt gestellt, bei 679 nicht.

Wurde zur Behandlung der Borreliose eine Antibiotika-Therapie länger als 3 Wochen durchgeführt?




Bei 442 (**52,81%**) der 837 befragten Erkrankten wurde zur Behandlung der Borreliose eine Antibiotika-Therapie länger als 3 Wochen durchgeführt, bei 395 kürzer als 3 Wochen.

Wurden Sie auf Ko-Infektionen getestet?




388 (**46,47%**) der 837 Befragten wurden auf Ko-Infektionen getestet.

Verbesserung der Beschwerden nach der Antibiose? (Antibiotika-Therapie wurde **länger als 3 Wochen durchgeführt)**




319 (**72,17%**) der 442 Befragten, die länger als 3 Wochen Antibiotika genommen haben, erlebten Verbesserungen der Beschwerden.

Verbesserung der Beschwerden nach der Antibiose? (Antibiotika-Therapie wurde **weniger als 3 Wochen durchgeführt)**



208 (**52,66%**) der 395 Befragten, die weniger als 3 Wochen Antibiotika genommen haben, erlebten Verbesserungen der Beschwerden.

Gab es einen Beschwerderückfall und/oder ein Fortbestehen einzelner Symptome nach der Antibiose?




Fazit: Bei 765 (91,40%) der 837 Befragten kam es trotz antibiotischer Behandlung zu Beschwerderückfällen.

Wie viele Ärzte haben Sie nach Beschwerdebeginn aufgesucht bis zur Borreliose-Diagnose?

Insgesamt befragte Personen: 837

Insgesamt besuchte Ärzte: 6155

Durchschnittliche Anzahl: 7,35




679 **(81,12%)** der 837 Befragten haben nicht im 1.Arztkontakt die Diagnose Borreliose erhalten.

Wie viel Zeit ist nach Beschwerdebeginn bis zur Diagnose vergangen?

weniger als 6 Monate	98
6 Monate bis weniger als 12 Monate	80
1 Jahr bis weniger als 2 Jahre	87
2 Jahre oder länger	414 (60,97%)


Die **30** erfassten Hauptsymptome in ihren unterschiedlichen Ausprägungen:

(Wir haben hier eine Palette von 30 Hauptsymptomen zu Gunsten der statistischen Auswertbarkeit vorgenommen.)




815 (**97,37%**) der 837 befragten Erkrankten ist das Auftreten der Symptome in Schüben mit symptomarmen Intervallen in individuell unterschiedlicher Länge bekannt.

Sehr stark	265
Stark	322
Mittel	179
Schwach	49




821 **(98,09%)** der 837 Befragten kennen die Symptome Erschöpfung, Leistungsverlust, fehlende Ausdauer/Kondition.

Sehr stark	458
Stark	258
Mittel	76
Schwach	29




732 **(87,46%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Gelenkschmerz/-schwellung Arme/Hände/Finger.

Sehr stark	194
Stark	237
Mittel	179
Schwach	122




732 **(87,46%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Gelenkschmerz/-schwellung Beine/Füße.

Sehr stark	211
Stark	219
Mittel	166
Schwach	136




770 **(92,00%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Rücken- und Schulterschmerzen.

Sehr stark	281
Stark	238
Mittel	170
Schwach	81



770 **(92,00%)** der 837 kennen das Symptom Kopf- und Nackenschmerzen mit Steifigkeit.


Sehr stark	278
Stark	247
Mittel	167
Schwach	78



764 **(91,28%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Brennen, stechen, kribbeln an unterschiedlichen Körperstellen.

Sehr stark	222
Stark	261
Mittel	202
Schwach	79


Sehstörungen, Schleier/Schlierensehen, entzündliche Augenveränderungen



697 (83,27%) der 837 Befragten kennen das Symptom Sehstörungen, Schleier/Schlierensehen, entzündliche Augenveränderungen.


Sehr stark	148
Stark	197
Mittel	213
Schwach	139

Hörstörungen, Pfeifen oder Rauschen oder Brummen, Tinnitus




632 (75,51%) der 837 Befragten kennen das Symptom Hörstörungen, Pfeifen oder Rauschen oder Brummen, Tinnitus.

Sehr stark	132
Stark	151
Mittel	186
Schwach	163




682 (81,48%) der 837 Befragten kennen das Symptom Taubheitsgefühle / Lähmungserscheinungen.

Sehr stark	106
Stark	179
Mittel	224
Schwach	173




752 (89,84%) der 837 Befragten kennen das Symptom situationsunangemessenes Frieren oder Schwitzen, verändertes Temperaturempfinden.

Sehr stark	241
Stark	246
Mittel	172
Schwach	93




696 **(83,15%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Gang und Greifunsicherheit.

Sehr stark	113
Stark	194
Mittel	255
Schwach	134




692 **(82,68%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Störungen der Feinmotorik/ Koordinationsstörungen.

Sehr stark	65
Stark	178
Mittel	252
Schwach	197




699 **(83,51%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Nächtliches Schwitzen.

Sehr stark	179
Stark	201
Mittel	182
Schwach	137




628 **(75,03%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Nächtlicher Harndrang.

Sehr stark	98
Stark	158
Mittel	205
Schwach	167



762 **(91,04%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Muskelkaterähnliche Gefühle ohne vorherige Belastung.


Sehr stark	234
Stark	258
Mittel	177
Schwach	93



641 **(76,58%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Blasen- und sexuelle Funktionsstörung.

Sehr stark	128
Stark	187
Mittel	185
Schwach	141


Schlafstörungen (zu viel bzw. zu wenig) (schlechtes Ein- und Durchschlafen)



781 **(93,31%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Schlafstörungen (zu viel bzw. zu wenig) / (schlechtes Ein- und Durchschlafen).

Sehr stark	316
Stark	257
Mittel	137
Schwach	71


Schwindel



702 **(83,87%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Schwindel.

Sehr stark	122
Stark	159
Mittel	227
Schwach	194


Konzentrations-, Denk-, Wahrnehmungs- oder Orientierungsstörung



780 **(93,19%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Konzentrations-, Denk-, Wahrnehmungs- oder Orientierungsstörung.


Sehr stark	231
Stark	286
Mittel	172
Schwach	91

Wortfindungsstörung




758 **(90,56%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Wortfindungsstörungen.

Sehr stark	134
Stark	232
Mittel	246
Schwach	146




684 **(81,72%)** der 837 Befragten kennen das Symptom "Nebel" im Kopf / demenzähnliche Symptome.

Sehr stark	154
Stark	205
Mittel	169
Schwach	156




617 **(73,72%)** der 837 Befragten kennen Psychiatrische Symptome.

Sehr stark	109
Stark	139
Mittel	202
Schwach	167




679 **(81,12%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Kurzatmigkeit und Atemnot bei nur geringer Belastung.

Sehr stark	130
Stark	206
Mittel	196
Schwach	147




573 **(68,46%)** der 837 Befragten kennen das Symptom Atemwegsinfekte.

Sehr stark	67
Stark	130
Mittel	182
Schwach	194



726 **(86,74%)** der 837 Befragten kennen Herz-Kreislaufsymptome z. B. Blutdrucksteigerungen, Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen.


Sehr stark	146
Stark	221
Mittel	228
Schwach	131



694 **(82,92%)** der 837 Befragten kennen Magen/ Darmsymptome.

Sehr stark	156
Stark	181
Mittel	215
Schwach	142


Plötzliche Gewichtsveränderungen Zu-/Abnahme ohne Änderung der Ernährung



614 (73,36%) der 837 Befragten kennen das Symptom plötzliche Gewichtsveränderungen Zu-/Abnahme ohne Änderung der Ernährung.


Sehr stark	137
Stark	165
Mittel	178
Schwach	134

Hautsymptome - Juckreiz, Veränderungen etc.



661 (78,97%) der 837 Befragten kennen Hautsymptome - Juckreiz, Veränderungen etc.

Sehr stark	106
Stark	148
Mittel	233
Schwach	174



466 (55,68%) der 837 Befragten kennen das Symptom Haarausfall.

Sehr stark	75
Stark	102
Mittel	142
Schwach	147