

Lyme disease in dogs

Lab report Nick

(2E) Babesiose: *Babesia canis* / *B. vogeli* (IFAT): **negativ (< 1:20)**.

Nach dem Babesien-AK-Testverfahren 'MegaScreen FLUOBABESIA canis' der Fa. MegaCor, Serial No. 4145 liegt der Babesien Antikörpertiter unter der (Blut-Plasma/-Serum) Verdünnung von 1:20 und ist als 'negativ' zu interpretieren.

Eine Verdünnung von <1:20 wird als negativ, >1:40 als positiv interpretiert.

(2F) Anaplasmose: *Anaplasma phagocytophilum* (IFAT): **negativ (< 1:50)**.

Nach dem Anaplasmen-AK-Testverfahren 'MegaScreen FLUOANAPLASMA ph.' der Fa. MegaCor, Serial No. 1211 liegt der Anaplasmen Antikörpertiter unter der (Blut-Plasma/-Serum) Verdünnung von 1:50 und ist als 'negativ' zu interpretieren.

Eine Verdünnung von <1:50 wird als negativ, >1:100 als positiv interpretiert.

(2J) Borreliose: *Borrelia burgdorferi* s.l. IgG (IFAT): **positiv (1:128)**.

Nach dem Borrelien-AK-Testverfahren 'MegaScreen FLUOBORRELIA' der Fa. MegaCor, Serial No. 1530, Zulassungs No. BG VV-B 254 liegt der Borrelien Antikörpertiter bei der (Blut-Plasma) Verdünnung von 1:128 und ist als 'positiv' zu interpretieren.

Eine Verdünnung von <1:64 wird als negativ, >1:64 als positiv interpretiert.

(2K) Toxoplasmose: *Toxoplasma gondii* (IFAT): **negativ (< 1:50)**.

Nach dem Toxoplasmen-AK-Testverfahren 'MegaScreen FLUOTOXOPLASMA g.' der Fa. MegaCor, Serial No. 12305 liegt der Toxoplasmen Antikörpertiter unter der (Blut-Plasma/-Serum) Verdünnung von 1:50 und ist als 'negativ' zu interpretieren.

Eine Verdünnung von <1:50 wird als negativ, >1:100 als positiv interpretiert.

(2L) Neosporose: *Neospora canis* (IFAT): **negativ (< 1:50)**.

Nach dem Neosporen-AK-Testverfahren 'MegaScreen FLUONEOSPORA c.' der Fa. MegaCor, Serial No. 2584, liegt der Neosporen Antikörpertiter unter der (Blut-Plasma) Verdünnung von 1:50 und ist als 'negativ' zu interpretieren.

Eine Verdünnung von <1:50 wird als negativ, >1:100 als positiv interpretiert.

(2N) Rickettsiose: *Rickettsia conorii* / *R. massiliae* (IFAT): **negativ (< 1:32)**.

Nach dem Rickettsien-AK-Testverfahren 'MegaScreen FLUORICKETTISIA con.' der Fa. MegaCor, Serial No. 0446 liegt der Rickettsia conorii Antikörpertiter unter der (Blut-Plasma/-Serum) Verdünnung von 1:32 und ist als 'negativ' zu interpretieren.

Eine Verdünnung von <1:64 wird als negativ, >1:64 als positiv interpretiert.

(2O) Bartonellose: *Bartonella henselae* (IFAT): **negativ (< 1:50)**.

Nach dem Bartonellen-AK-Testverfahren 'MegaScreen FLUOBARTONELLA h.' der Fa. MegaCor, Serial No. 21324 liegt der Bartonellen Antikörpertiter unter der (Blut-Plasma/-Serum) Verdünnung von 1:50 und ist als 'negativ' zu interpretieren.

Eine Verdünnung von <1:50 wird als negativ, >1:100 als positiv interpretiert.

Sonstiges:

Es wurden folgende Dauerpräparate hergestellt: EDTA-Blut (1**).

(**) Diese Präparate werden archiviert, und können ggf. zu weiterer Diagnostik angefordert werden.